

減中風後遺 把握黃金 4.5 小時

【本報訊】中風是本港第四號殺手，每年奪 3,500 人命，但不少患者急性中風，出現嘴歪、說話不清或四肢無力時，沒第一時間求醫，錯過病發後首 4.5 小時的黃金治療時間。新界東的公院明年將有關的救治服務延長至 24 小時無休，料每月可多救 7 人。

港第四號殺手 年奪 3500 命

有腦神經科專科醫生呼籲市民，如出現中風病徵，應盡快求醫，以減致殘障後遺症。

59 歲羅女士，今年 2 月一天早上，突感腳部無力、說話困難、面歪，因丈夫曾因中風未能及時獲得醫治而現時行路不便，故羅對中風警覺性相當高，當她發病 2.5 小時後即到威院求醫，接受溶栓治療後，目前病徵消除，幾乎全面康復。

本港每年約 1.8 萬人次因中風入院，中風亦是引致成人殘障的主因，80% 中風為缺血性中風，亦多為是突發性，患者會突半邊手腳無力或感覺麻木、言語不清、臉部不對稱或嘴歪、視力突然模糊。

威爾斯醫院腦神經科副顧問醫生蘇藹欣指，患者發病時，未必第一時間去求醫，以為先在家休息、或看跌打、或等家人回來後商量，便錯失了首 4.5 小時的黃金治療時間。

新界東溶栓治療 明年 24 小時

威院 08 年起引入溶栓治療，利用靜脈或動脈注射，為 75 名出現急性缺血性中風，並能在發病後首 4.5 小時求醫的患者，利用此治療成功把腦血管內堵塞的血塊消除或吸走。

蘇說，通過這種治療方法，患者康復機會可逾 30%，較傳統普通預防治療效果佳，但亦有 6% 機會出現嚴重出血風險，但發病 4.5 小時後才求醫、病情太輕或太重的病人，因頸椎退化、偏癱性偏頭痛、電解質不平衡等引致的假中風，都不適合用這方法治療。

為加強這類中風治療服務，新界東醫院聯網把溶栓治療服務時間由現 12 小時，至明年初增至 24 小時，預計在非辦公時間每月可多為 7 名病人治療，同時亦會利用視像醫學遙距支援北區和大埔醫院的病人。